



2-01-2

# 公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

106 學 年 度 科 技 校 院 二 年 制  
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

## 護 理 類

### 專業科目(二)：基本護理學

#### 【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

- 有關行為過程記錄 (process recording) 之敘述，下列何者正確？  
(A) 以事後回溯方式記錄互動過程  
(B) 主要是以客觀第三者的角度記錄病人與家屬間的行為互動過程  
(C) 會談後之記錄不宜立即記錄，以利訓練自我覺察能力  
(D) 會談情境中有受到外界環境影響，則不需記錄
- 有關護理過程與護理記錄之關係，下列敘述何者正確？  
① DART 的「R」為護理過程中的評值  
② SOAP 的「A」為護理過程中的評估  
③ SOAPIER 的「I」為護理過程中的執行  
④ DART 的「A」為護理過程中的診斷  
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①③
- 常用的醫學英文縮寫，下列中文解釋何者正確？  
(A) S.C.：皮下 (B) P.I.：身體檢查 (C) M.N.：每晚 (D) O.D.：右耳
- 有關物理消毒法之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 煮沸法是最經濟的消毒法，但對芽孢效果不佳  
(B) 紫外線消毒法因為穿透力強，對芽孢效果佳  
(C) 巴斯德消毒法常用於乳製品或果汁消毒  
(D) 流動蒸氣消毒法之溫度為 100°C，多用於餐具或便盆
- 有關醫療照護相關感染之敘述，下列何者正確？  
(A) 阻斷開放性肺結核傳染最有效的方法是隔離措施  
(B) 感染鏈中的帶菌者是指已出現臨床症狀的病人  
(C) 醫療照護相關感染的控制，最基本有效方法是戴口罩  
(D) 使用抗生素是醫療照護相關感染最有效預防策略
- 下列各項預防疾病傳染的方式，何者主要作用不是用於阻斷傳染鏈之傳染途徑？  
(A) 在環境中噴灑消毒劑以預防登革熱傳染  
(B) 血品檢驗以預防經由輸血感染 C 型肝炎  
(C) 提供免費消毒針具給毒癮者使用以預防愛滋病傳染  
(D) 避免餵食與接觸禽鳥以預防禽流感
- 關於護理目標之敘述，下列何者較具體且適當？  
(A) 病人活動度增加 (B) 病人疼痛程度緩解  
(C) 病人焦慮情緒能改善 (D) 病人每日能自行步行 200 公尺
- 護理診斷及其導因之書寫，下列敘述何者正確？  
(A) 焦慮、肢體活動功能障礙/踝關節腫脹、無法行走  
(B) 營養攝取多於身體所需/對每日應攝取熱量知識缺乏  
(C) 頭痛/高血壓  
(D) 焦慮：無法入睡/即將進行心導管檢查
- 個案出現 ① 呼吸急促 ② 營養狀況多於身體所需 ③ 睡眠型態紊亂三項健康問題，護理人員處理的優先順序是：  
(A) ① → ② → ③ (B) ② → ① → ③ (C) ③ → ① → ② (D) ① → ③ → ②

10. 執行護理評估時，下列何者屬於客觀資料？
- ①個案：昨晚頭好痛，痛到睡不著                      ②家屬：他壓力太大了，頭就會痛  
③護理師：個案皺眉，雙手抱頭                      ④血壓：130/85 mmHg  
(A) ①②                      (B) ③④                      (C) ①③                      (D) ②④
11. 李小姐因盲腸炎開刀，腹部傷口疼痛，護理師以PQRST進行疼痛評估，下列敘述何者正確？
- (A) Q (quality)：「傷口疼痛反射至背部」  
(B) R (radiation)：「傷口疼痛像抽痛」  
(C) S (severity)：「傷口有6分的痛」  
(D) P (provocation)：「翻身後傷口最痛」
12. 協助產後婦女進行會陰部沖洗，下列敘述何者正確？
- (A) 沖洗液溫度應該高於45°C以免產婦著涼  
(B) 沖洗壺壺口朝向床頭，由恥骨聯合處往會陰部沖洗  
(C) 沖洗順序為尿道口至陰道口，最後至大陰唇  
(D) 會陰部惡露附著會陰時，應用沖洗棉棒來回清洗掉
13. 睡眠中全身肌肉張力極度降低、體溫及心跳上升，是屬於睡眠週期的哪一期？
- (A) 非快速動眼第一期                      (B) 非快速動眼第二期  
(C) 快速動眼期                      (D) 非快速動眼第四期
14. 對於睡眠障礙病人的居家護理指導，下列敘述何者正確？
- (A) 夜間宜保持光線的明亮，以防跌倒  
(B) 睡前建議進行中高強度的運動  
(C) 睡前可喝溫烏龍茶以促進睡眠  
(D) 白天盡量不要睡覺、午睡時間不要過長
15. 王奶奶輕度失智，因泌尿道感染住院，進行護理指導時，下列敘述何者錯誤？
- (A) 照顧者於病人如廁後由後往前擦拭會陰部  
(B) 評估病人對於泌尿道感染的認知狀態  
(C) 以會陰模型示範及回示教會陰清潔方法  
(D) 安排病人每2小時上廁所一次
16. 住院病人留有存留導尿管，抱怨存放管路不適且有尿意感，下列何項護理措施最合適？
- (A) 告訴病患這是正常現象，忽略感覺就好  
(B) 告訴病患導尿管放置目的，請病患忍耐  
(C) 重新檢視導尿管引流狀態  
(D) 重新放置號碼較大的導尿管
17. 林老太太上排活動假牙，下排留有六顆牙齒，有關進食後口腔護理措施，下列敘述何者正確？
- (A) 假牙使用後應立即清潔，以乾紗布包裹待下次進食再戴上  
(B) 進食後以清水漱口，不須將假牙取下以維持臉部外觀  
(C) 下排牙齒以牙刷清潔，刷毛與齒面呈90度來回刷  
(D) 下排牙齒須將牙刷壓入牙齦與牙齒之縫隙進行清潔

18. 詹先生因中風導致右側肢體癱瘓，在住院期間發生肺炎，協助翻身擺位時，下列敘述何者正確？  
(A) 仰臥時右側下肢使用粗隆捲軸以預防髖關節外旋  
(B) 半坐臥應抬高床頭 45 ~ 60 度  
(C) 側臥時身體重心應該落於下側的肩膀及膝部  
(D) 採俯臥姿勢以擴展胸腔
19. 李小姐 24 小時尿液約 300 c.c.，不易解出尿液且排尿時有疼痛及不適感，最可能為下列何種症狀？  
(A) 閉尿                      (B) 無尿                      (C) 排尿困難                      (D) 排尿遲疑
20. 有關正常的排便機轉，下列敘述何者正確？  
(A) 胃結腸反射可引起副交感神經興奮而促發腸道的質塊運動  
(B) 直腸壓力上升至 20 ~ 30 mmHg 時會引發直腸排便反射  
(C) L2 ~ L4 是排便反射中樞刺激交感神經反射興奮  
(D) 肛門內括約肌收縮、外括約肌放鬆可引發排便
21. 有關發燒個案護理措施之敘述，下列何者正確？  
① 每 4 小時或更密切偵測體溫趨勢變化  
② 心臟病或腎衰竭個案仍應補充 3000 c.c. 水份  
③ 鼓勵個案發燒期間增加下床活動以促進新陳代謝  
④ 鼓勵個案攝取高蛋白、高維生素飲食以增加抵抗力  
(A) ①②                      (B) ③④                      (C) ①④                      (D) ②③
22. 有關陳施氏呼吸 (Cheyne - Stokes respiration) 特徵之敘述，下列何者正確？  
(A) 淺而慢呼吸，速率與深淺漸增至呼吸困難，隨即下降至呼吸暫停  
(B) 規則性、深而快的呼吸，且伴隨使用呼吸輔助肌  
(C) 呼吸速率及深度都不規則，且會伴隨呼吸暫停  
(D) 緩而淺呼吸，呼吸速率及深度逐漸減慢至呼吸暫停
23. 下列何種情況較不會造成呼吸速率下降？  
(A) 初期休克                      (B) 血中 CO<sub>2</sub> 下降  
(C) 使用麻醉性止痛藥                      (D) 顱內高壓
24. 王先生血壓值：144 / 92 mmHg，其平均動脈壓 (mean arterial pressure, MAP) ？  
(A) 140 mmHg                      (B) 123 mmHg                      (C) 118 mmHg                      (D) 109 mmHg
25. 下列何者不是熱療法的禁忌症？  
(A) 不明原因腹痛                      (B) 裝置心律調節器者  
(C) 開放性傷口或造瘻口                      (D) 慢性下背痛或經痛
26. 有關冷療法之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 適用於肌肉拉傷之 24 ~ 72 小時內  
(B) 可以降低心臟負荷、增加血液濃稠度  
(C) 為了增加用冷效果，持續使用 60 分鐘  
(D) 溫水拭浴水溫為 27 ~ 37 °C，並以輕拍身體方式

27. 有關繃帶包紮之敘述，下列何者正確？  
(A) 包紮手腳時應由手腳的近心端朝遠心端包紮  
(B) 固定肢體功能，包紮時宜避免露出肢體末端  
(C) 固定肢體功能，包紮完畢時宜在關節處作結帶  
(D) 避免局部受壓或摩擦，可於腋下或骨突處放置棉墊
28. 有關臨終病人呼吸系統變化及其護理之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 可能會出現潮式或喞嘆式呼吸  
(B) 可能會出現吵雜呼吸音，稱為臨終嘎聲  
(C) 評估輸出入量，宜避免給予過多液體  
(D) 睡前宜多抽痰，以減少因嘎聲影響睡眠品質
29. 當醫生告訴石太太切片檢查結果為乳癌時，石太太表示「一定是醫生弄錯了！我都吃健康飲食、規律運動，定期做健康檢查，怎麼可能會得癌症？」此時石太太的心理反應階段為何？  
(A) 否認期                      (B) 憤怒期                      (C) 磋商期                      (D) 憂鬱期
30. 有關臨終病人的護理重點，下列何者正確？  
(A) 為了提供個案安靜環境，於病人床邊竊竊私語為宜  
(B) 保持室內昏暗且盡量讓個案獨處，以追求自我靈性需求  
(C) 對於無法由口進食者，仍宜尊重個案是否要放置鼻胃管  
(D) 為了減少個案哀傷情緒，宜避免讓個案及家屬彼此表達感受
31. 下列哪些族群是住院期間容易發生跌倒的高危險群？  
① 六歲的兒童  
② 身體麻痺的病人  
③ 憂鬱的病人  
④ 服用降血糖藥物的病人  
⑤ 經產婦  
(A) ①②③                      (B) ②③④                      (C) ③④⑤                      (D) ①④⑤
32. 關於洗手法的敘述，下列何者正確？  
① 雙手搓洗範圍，從指尖到腕關節上一吋  
② 雙手搓洗順序為掌面、手背、指間、指背、虎口、指尖、手腕及手臂  
③ 內科無菌洗手，沖水時手指尖需朝上高於手肘  
④ 乾洗手之雙手搓洗時間約需 20~30 秒  
(A) ①③                      (B) ②④                      (C) ①②                      (D) ③④
33. 有關治療性溝通行為的描述，下列何者錯誤？  
(A) 護理人員問病人：「我不太了解您的意思，可以請您再說一次嗎？」是運用「澄清 (seeking clarification)」的溝通技巧  
(B) 當病人問及：「我該怎麼辦呢？要不要換另外一種治療方式呢？」，此時護理人員回答：「您認為呢？」使用的是「反映 (reflecting)」的技巧  
(C) 當病人說：「我覺得很無助」，護理人員回答：「是什麼樣的事情讓您有這樣的感覺呢？」是運用「集中焦點 (focusing)」的技巧  
(D) 護理人員問病人：「昨晚睡得好嗎？」是運用「開放式 (open question)」溝通技巧

34. 當病人問：「我怎麼復健這麼久，還是沒有進步？」此時護理人員的回答，何者最適當？  
(A) 因為您不認真做復健，所以才看不到效果  
(B) 您為什麼這麼認為呢  
(C) 您應該要多認真做復健才是  
(D) 沒問題的，只要您持續復健一定會好起來的
35. 下列何者為專業性人際關係之特性？  
①彼此有相同的信念  
②以病人為中心，共同訂定目標  
③彼此的互動可隨興、隨意、無特定時間地點  
④彼此關係為暫時性的，有一定的期限  
(A) ①③ (B) ②④ (C) ①② (D) ③④
36. 護理人員評估阻塞性腦中風病人出院前，發現其右側手腳肌肉有收縮力且能水平移動，但無法對抗重力，此時其肌肉力量等級為何？  
(A) 微弱 (trace) (B) 不佳 (poor) (C) 尚可 (fair) (D) 良好 (good)
37. 承上題，評估病人左側手腳肌肉力量正常，該病人出院後適合的運動為何？  
(A) 左側肢體行阻力運動、右側肢體被動運動  
(B) 左側肢體行主動運動、右側肢體協助性主動運動  
(C) 左側肢體行阻力運動、右側肢體協助性主動運動  
(D) 左側肢體行主動運動、右側肢體被動運動
38. 有關活動種類之敘述，下列何者正確？  
(A) 等張運動可以維持肌肉張力及力量  
(B) 等長運動可以增加肌肉力量，維持關節活動度  
(C) 手伸直推牆為等張運動  
(D) 凱格爾式 (Kegel's) 運動為等長運動
39. 有關尿液培養的敘述，下列何者正確？  
①最好是晨起第一次解的尿液  
②懷疑有尿道感染者，宜先注射抗生素後收集尿液檢體  
③可以導尿取得中段尿液  
④於兩小時內送檢  
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
40. 有關血液培養檢體收集之敘述，下列何者正確？  
①於靜脈輸注部位上方約 3~5 公分處採血  
②以 75% 酒精棉棒在採血部位由內向外環型消毒皮膚三次  
③抽血時針頭斜面向上與採血處呈 45 度角插入靜脈血管  
④抽血後須更換針頭再注入培養瓶  
⑤先注入厭氧瓶再注入需氧瓶  
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①④⑤
41. 關於成人鼻胃管灌食法，下列何者錯誤？  
(A) 灌食空針與胃之距離約為 25~30 公分 (B) 首次灌食量不超過 150~250c.c.  
(C) 餵食時間應在 15~20 分鐘內完成 (D) 灌食溫度大約 37.8~40.5℃

42. 腸道檢查或腸道手術前所採用之清流飲食，下列何者正確？  
(A) 豆花、米漿、蒸蛋 (B) 奶類、肉汁、豆漿  
(C) 肉湯、米湯、果汁 (D) 糖水、去油肉湯、米湯
43. 曾先生，40 歲，身高 180 公分，體重 90 公斤，腰圍 92 公分。下列對曾先生的判斷，何者正確？  
(A) 體重過重、腰圍正常 (B) 體重過重、腰圍過大  
(C) 輕度肥胖、腰圍正常 (D) 輕度肥胖、腰圍過大
44. 關於盤尼西林皮膚試驗的敘述，下列何者正確？  
(A) 注射劑量為 100~200 單位 (B) 針斜面插入皮下，不可過深  
(C) 注射前應輕微反抽確認位置 (D) 注射部位  $\geq 10$  mm 紅腫表(+)反應
45. 當長期服用某種藥物，在停藥後出現焦慮、心虛等症狀，此現象稱為：  
(A) 副作用 (Side effect) (B) 耐藥性 (Tolerance)  
(C) 習慣性 (Habituation) (D) 致敏化 (Sensitization)
46. 藥物醫囑中之途徑與時間「S.L.qod」代表的意義，下列何者正確？  
(A) 每天一次舌下含服 (B) 每隔一日一次舌下含服  
(C) 每天一次皮下注射 (D) 每隔一日一次皮下注射
47. 在輸血最初 5~15 分鐘病人出現呼吸困難、心搏過速、發燒、寒顫及低血壓等症狀，最可能是下列何種反應？  
(A) 過敏反應 (B) 急性溶血反應 (C) 熱原反應 (D) 循環過荷反應
48. 靜脈輸注常見問題的處理措施，下列何者最適當？  
(A) 若注射部位有腫脹、壓痛及刺痛感，應給予局部冷敷  
(B) 沿著靜脈出現一紅線，可給予濕冷敷並輕輕按摩  
(C) 空氣進入過多可能栓塞時，應採左側臥並將頭部放低  
(D) 注射部位有紅腫情形時，應減慢注射速度並繼續觀察
49. 當病人出現肌肉軟弱、刺麻感、腸蠕動音減少、心電圖顯示 T 波倒立，是何種電解質不平衡的問題？  
(A) 低血鉀 (B) 高血鉀 (C) 低血鈉 (D) 高血鈣
50. 有關靜脈溶液之敘述，下列何者正確？  
(A) Lactated Ringer's 為等張溶液，適用於肝臟疾病患者  
(B) 2.5% glucose dextrose 為低張溶液，適用於尿崩症患者  
(C) 0.45% NaCl 為低張溶液，適用於嚴重燒傷患者  
(D) Ringer's solution 為等張溶液，適用於輸血前後使用

【以下空白】

