

110 年統測試題或答案確認說明

| | |
|---------------|---|
| 考科名稱 | 二技-專業科目(二)-護理類 |
| 試題題號 | 4 |
| 試題內容 (含選項) | 甲藥的藥效為 A，乙藥的藥效為 B，兩藥同時使用的藥效為 C，當 C 小於 A 加 B，屬於下列何者？ (A)耐受作用 (tolerance) (B)相加作用(addition) (C)協同作用(synergism) (D)拮抗作用(antagonism) |
| 公告答案 | D |
| 確認說明 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 當合併二種藥物(甲藥+乙藥)後，效果 C 小於甲藥效果 A 和乙藥效果 B 單獨使用的總和，表示發生拮抗(antagonism)作用，亦即甲藥和乙藥同時使用後，兩種藥物效果有相互減弱或抵消的情形。 2. 當合併二種藥物(甲藥+乙藥)後，效果 C 大於於甲藥效果 A 和乙藥效果 B 單獨使用的總和，則為協同作用(synergism)。 3. 故本題最適當答案為(D)。 |

| | |
|---------------|---|
| 考科名稱 | 二技-專業科目(二)-護理類 |
| 試題題號 | 20 |
| 試題內容 (含選項) | 有關臥式及其支托位置的敘述，下列何者正確? (A)仰臥姿(supine position)置放粗隆捲軸的位置在小腿 (B)俯臥姿(prone position)置放枕頭在小腿下 (C)側臥姿(lateral position)置放枕頭在雙小腿下 (D)半坐臥姿(semi-Fowler's position)置放枕頭在腰下 |
| 公告答案 | B |
| 確認說明 | 1. (A)仰臥姿(supine position)置放粗隆捲軸的位置在腰至膝關節處，而非小腿。 2. (B)俯臥姿(prone position)置放枕頭在小腿下。 3. (C)側臥姿(lateral position)置放枕頭在雙腿間，而非在雙小腿下。 4. (D)半坐臥姿(semi-Fowler's position)置放枕頭在頭肩部，以支持頭、頸、肩及背部上半處；背、腰放一枕，以保持脊柱平直。是故是背與腰之間置枕，而非腰下。 5. 故本題最適當答案為(B)。 |