

111 年統測試題或答案確認說明

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	4
試題內容 (含選項)	<p>有關出院終期消毒的敘述，下列何者<u>錯誤</u>？</p> <p>(A) 一般病人單位的床褥及病床以 2 % Lysol 擦拭</p> <p>(B) 一般病人單位使用的橡皮中單以清水清洗後備用</p> <p>(C) 傳染性病人單位地板沾有血跡應以 0.6 % 漂白水擦拭</p> <p>(D) 傳染性病人單位以紫外線照射 30 分鐘並空置 6 小時再鋪床</p>
公告答案	D
確認說明	<p>1. 對於具有傳染疾病病床進行終期清消，當沾血液的地板可以使用 0.6% 漂白水進行擦拭，0.06% 漂白水用於一般環境消毒。進一步說明，漂白水消毒濃度可以 0.06%~0.6%。選項(C)傳染性病人單位地板沾有血跡應以 0.6 % 漂白水擦拭，並非錯誤選項。</p> <p>2. 傳染病房須於消毒後靜置 12~24 小時後方能鋪床而非 6 小時。</p> <p>3. 故本題最適當答案為(D)。</p>

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	17
試題內容 (含選項)	血清鉀離子(potassium)為 2.7 mEq / L，可能出現的症狀或徵象何者正確？ ① 腸蠕動音減少 ② 多尿 ③ 肌肉軟弱 ④ 心律不整 ⑤ 體溫上升 ⑥ 吞嚥困難 (A) ① ③ ④ (B) ② ⑤ ⑥ (C) ① ② ④ (D) ③ ⑤ ⑥
公告答案	A
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> 血清鉀離子濃度 2.7 mEq/L 屬於低血鉀，其症狀或徵象會出現：肌肉軟弱無力、心律不整、噁心、嘔吐、腸蠕動音減少、深部肌腱反射喪失等，故題目中①腸蠕動音減少，③肌肉軟弱，④心律不整為正確。 尿崩症患者，或是使用利尿劑或輕瀉劑者，可能使血清鉀離子排出過多導致血清鉀離子濃度降低造成低血鉀，是其低血鉀的導因，而非低血鉀的症狀或徵象。 低血鉀之臨床表徵中出現多尿症狀通常是在長期低血鉀症導致腎臟的尿液濃縮能力降低，而造成尿液稀釋。此題並非長期亦未有腎臟的尿液濃縮能力受損之描述。 故本題最適當答案為(A)。

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	47
試題內容 (含選項)	<p>不同給藥方式的吸收速率，由慢到快的順序何者正確？</p> <p>① 口服投予 ② 舌下含服 ③ 吸入法 ④ 直腸投予 ⑤ 皮下注射 ⑥ 肌肉注射 ⑦ 靜脈注射</p> <p>(A) ① ④ ⑥ ③ (B) ① ⑤ ④ ⑦ (C) ③ ⑤ ⑥ ⑦ (D) ② ③ ⑤ ⑥</p>
公告答案	A
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不同給藥方式之吸收速率，由慢到快之順序，依序為：口服投予<直腸(肛門)投予/舌下含服<皮下注射<肌肉注射<吸入法<靜脈注射。 2. 皮下注射給胰島素的部分仍需要考量藥物本身之特性，包含分子大小、脂溶性及解離度特性。 3. 肛門投藥，因直腸吸收表面積小，腸腔內液體量少且PH值較高(約PH8.0)，因此直腸內給藥其吸收速率僅高於口服給藥。 4. 故本題最適當答案為(A)。